



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

TD COMPOSES AROMATIQUES - BENZENE

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

PROF : M. DIOP (PC)

ANNEE 2023-2024

Niveau : PREMIERE S2

❖ Exercice 1:

Donner la formule semi-développée des composés suivants :

- a) 1,2-diméthylbenzène ; b) orthodiméthylbenzène ; c) paradichlorobenzène
d) 1-bromo-2,6-dinitrobenzène ; e) 2,4,6-trinitrotoluène.

❖ Exercice 2:

Compléter les réactions suivantes du noyau aromatique en précisant à quelle catégorie elles appartiennent.

a) $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{U.V} X$	b) $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} V + Z$
c) $C_6H_5 - CH_3 + H_2 \xrightarrow{Ni} Y$	d) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Z + L$
e) $C_6H_5 - CH_3 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} M + N$	f) $C_6H_5Cl + H_2 \xrightarrow{Pt} W$

❖ Exercice 3:

1- La formule $C_6H_3N_3O_6$ est celle d'un dérivé trinité du benzène.

Ecrire toutes les formules semi-développées possibles et proposer un nom pour chacun des isomères.

2- Un carbure aromatique A a pour formule brute C_8H_{10} .

a- Ecrire toutes les formules semi-développées possibles et proposer un ou plusieurs noms pour les composés correspondants.

b- Déterminer la formule semi-développée de A sachant que sa mono nitration ne peut donner naissance qu'à un seul isomère

c- Donner toutes les formules semi-développées des dérivés obtenus par mono nitration des composés écrits à la question a).

❖ **Exercice 4:**

Un hydrocarbure A a pour formule brute C_9H_{12} .

- Par hydrogénation, en présence d'un catalyseur, A donne un corps B de formule brute C_9H_{18} .
- En présence de dibrome et de tri bromure de fer ($FeBr_3$), A donne un produit de substitution C contenant 40,2% de brome en masse

1. Montrer que A renferme un noyau benzénique
2. Montrer que le brome ne se substitue qu'une fois sur A
3. Ecrire toutes les formules possibles pour A (elles sont au nombre de 8)
4. Il n'existe qu'un seul dérivé mono nitré de A . En déduire la formule semi- développée de A .

Données : $H = 1$; $C = 12$; $Br = 80$.

❖ **Exercice 5:**

Dans 10 cm³ d'un mélange de benzène et de styrène a doser, on introduit un peu de bromure de fer (III) puis, goutte a goutte et en agitant, du dibrome pur tant que la coloration brun-rouge ne persiste pas.

Le dégagement gazeux qui se produit simultanément est envoyé à barboter dans une solution de nitrate d'argent, ou il provoque la formation d'un précipité blanc jaunâtre.

On admettra que ces conditions opératoires ne permettent pas de poly substitutions sur les noyaux benzéniques.

Le volume de dibrome versé est de $8,4 \text{ cm}^3$; le précipité blanc est filtré, séché et pesé : sa masse est de $19,1 \text{ g}$.

- Quelles sont les réactions mises en jeu dans cette manipulation ?
- Déterminer les compositions molaires et volumiques de l'échantillon étudié
- Sachant que la masse volumique du benzène est de $880 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, déterminer celle du styrène.

Donnée: masse volumique du dibrome : $\mu = 3250 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

❖ **Exercice 6:**

On réalise la mono nitration du toluène $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$

- Ecrire l'équation bilan de la réaction et la formule semi-développée du composé obtenu - sachant que la nitration s'effectue surtout en position para rapport au groupement méthyle. Préciser les conditions expérimentales.
- Le para nitrotoluène est un liquide de masse volumique 1100 kg/m^3 . Déterminer la quantité de matière totale de nitrotoluène que l'on peut fabriquer à partir de 100 kg de toluène sachant que le rendement de la réaction est de 90% .
- En réalité, il se forme 2% de méta nitrotoluène et $0,5\%$ d'ortho nitrotoluène. Calculer alors le volume de para nitrotoluène obtenu

❖ **Exercice 7:**

- Ecrire l'équation -bilan de la réaction de combustion complète du benzène.
- On effectue la combustion de 5 cm^3 de benzène quel est le volume de dioxygène nécessaire? Quel est le volume d'air correspondant (dans les conditions normales)

3. La combustion complète d'une mole de benzène s'accompagne d'un dégagement de chaleur de 3300kj environ. Quelle est la quantité de chaleur dégagée lors de cette expérience ?
4. Lorsqu'on réalise la combustion a l'air libre, la flamme est fuligineuse. Pourquoi ?

densité du benzène liquide $d = 0.9$

❖ **Exercice 8:**

Un hydrocarbure A , de formule $C_{14}H_{10}$ possède 2 noyaux benzéniques sans «coté » commun Soumis a une hydrogénation catalytique sur palladium désactivé, A fournit l'hydrocarbure B de formule $C_{14}H_{12}$. B peut, a son tour, être hydrogéné a la température et a la pression ordinaire, sue nickel divisé : on obtient C de formule $C_{14}H_{14}$. C soumis a une hydrogénation sur platine, a température et pression élevées, conduit a un hydrocarbure D de formule $C_{14}H_{26}$. Lorsque, par ailleurs, l'hydrocarbure C est placé a la lumière en présence de dichlore, il donne naissance a un produit mono chloré unique E et un dégagement de chlorure d'hydrogène.

1. En déduire la formule semi développée de chacun des composées A, B, C, D et E
- 2) Sachant que l'hydrogénation catalytique sur palladium désactivé du but-2-yne conduit exclusivement au but-2-ène (Z), et que ce résultat est généralisable, en déduire la nature (Z) ou (E) de celui des corps A, B, C ou E qui possèdent ce type d'isomérie .
3. Ecrire les équations bilan de toutes les réactions
Dire, pour chacune d'elle, s'il s'agit d'une addition ou d'une substitution.

INSTITUT MBACKÉ MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privées en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Assistante de direction

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbackes883@gmail.com



Dakar, Sénégal